

OPEN & AFFORDABLE DENTAL BRACES

INSTRUCCIONES POSOPERATORIAS PARA EL INJERTO ÓSEO

La siguiente información se aplica cuando se ha colocado material de injerto en los sitios de extracción para ayudar a preservar en preparación para un posible reemplazo implante del del diente extraído.

Si se produce sangrado, coloque un trozo de gasa húmeda en el área con una ligera presión durante 30 minutos.

Su injerto de hueso está formado por muchas partículas. **Es posible que encuentre algunos pequeños gránulos en la boca durante los primeros días. No se alarme por estos. Es normal que algunos de ellos salgan del sitio del injerto y entren en su boca.**

No moleste ni toque la herida.

PUNTOS DE SUTURA: Se colocó una sutura reabsorbible sobre el injerto óseo, así como un tapón de colágeno. Ambos se disolverán por sí solos.

DIETA: Se recomienda una dieta blanda en el sitio del injerto óseo. No mastique sobre el área injertada de hueso, trate de empujar cualquier alimento hacia el lado opuesto de la boca.

Evite los popotes, escupir y fumar durante 5 días para permitir la estabilización del material de injerto.

HIGIENE BUCAL:

- No cepille el área.
- Use su enjuague de clorhexidina recetado y limpie el área con un hisopo hasta que regrese para su cita posoperatoria.
- Puede cepillar ligeramente el área circundante.
- Es muy importante mantener limpia la zona.

MEDICAMENTOS:

- Se le recetó un antibiótico para prevenir infecciones, asegúrese de terminar la receta completa.
- Para el dolor, use primero medicamentos de venta libre; estos pueden incluir Advil, Motrin o ibuprofeno. Puede tomar hasta 3 comprimidos (600 mg) cada 6 horas durante 3 días. Si necesita algo más fuerte, use el medicamento recetado que le dieron. No tome Tylenol (acetaminofeno) si también está usando el medicamento recetado para el dolor; la receta ya contiene Tylenol.
- Asegúrese de tener alimentos o líquidos en el estómago cuando tome estos medicamentos para reducir el malestar estomacal, como náuseas o vómitos. No tome más medicamento de lo indicado.

Una cierta cantidad de dolor después de un injerto óseo no es infrecuente. La gravedad del dolor suele estar relacionada con el estado de los dientes antes de las extracciones o con la dificultad para extraer los dientes. Después de 3 días, el dolor debería ser mínimo. Si su dolor es cada vez mayor y / o tiene un dolor de oído significativo, comuníquese con nuestra oficina.

ACTIVIDAD FÍSICA: No debe haber actividad física (ejercicio, etc.) durante al menos 5 días después del procedimiento. Además, no debe levantar más de 15 libras.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA EN CUALQUIER MOMENTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRA OFICINA.